

「藥品給付規定」修訂對照表

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自107年9月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>2.1.5. 直接凝血酶抑制劑(Direct thrombin inhibitors)： <u>Dabigatran(如 Pradaxa)</u> (101/6/1、104/12/1、<u>107/9/1</u>)</p> <p>1. <u>用於非瓣膜性心房纖維顫動病患：</u></p> <p>(1) 須符合下列條件之一：</p> <p>I. <u>曾發生中風或全身性栓塞。</u></p> <p>II. <u>左心室射出分率小於40%。</u></p> <p>III. <u>有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</u></p> <p>IV. <u>年齡75歲(含)以上。</u></p> <p>V. <u>年齡介於65歲至74歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。</u></p> <p>(2) <u>150mg 或110mg 膠囊，每日2次，每次限1粒；75mg 膠囊每日2次，每次限2粒(107/9/1)</u></p> <p>(3) 排除標準：</p> <p>I. <u>病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。</u></p>	<p>2.1.5. 直接凝血酶抑制劑(Direct thrombin inhibitors (101/6/1、104/12/1)</p> <p><u>2.1.5.1. Dabigatran 110mg 及150mg</u> <u>(如 Pradaxa 110mg 及150mg)</u> <u>(101/6/1、104/12/1)</u></p> <p>1. <u>限用於非瓣膜性心房纖維顫動病患，且須符合下列條件之一：</u></p> <p>(1) <u>曾發生中風或全身性栓塞。</u></p> <p>(2) <u>左心室射出分率小於40%。</u></p> <p>(3) <u>有症狀之心臟衰竭：收案前依紐約心臟協會衰竭功能分級為第二級或以上。</u></p> <p>(4) <u>年齡75歲(含)以上。</u></p> <p>(5) <u>年齡介於65歲至74歲且合併有糖尿病、高血壓或冠狀動脈疾病。</u></p> <p>2. 排除標準：</p> <p>(1) <u>病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。</u></p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p><u>II.</u> 14 天內發生中風。</p> <p><u>III.</u> 收案前的6個月內發生嚴重中風。</p> <p><u>IV.</u> 有增加出血風險的情況。</p> <p><u>V.</u> 肌酸酐清除率小於30mL/min。</p> <p><u>VI.</u> 活動性肝病和懷孕。</p> <p><u>2.</u> 用於靜脈血栓高危險病患，接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)。</p> <p><u>(1)</u> 須符合下列條件之一：</p> <p><u>I.</u> 曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患。</p> <p><u>II.</u> 經靜脈超音波檢查（Venous ultrasonography）、靜脈攝影（Venography）或血中 D-dimer 檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。</p> <p><u>(2)</u> 限用75mg，每日至多二粒，人工髖關節手術術後治療，最多5週；人工膝關節手術術後治療，最多2週。</p> <p><u>(3)</u> 排除標準：</p> <p><u>I.</u> 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾</p>	<p><u>(2)</u> 14 天內發生中風。</p> <p><u>(3)</u> 收案前的6個月內發生嚴重中風。</p> <p><u>(4)</u> 有增加出血風險的情況。</p> <p><u>(5)</u> 肌酸酐清除率小於30 mL/min。</p> <p><u>(6)</u> 活動性肝病和懷孕。</p> <p><u>2.1.5.2.</u> <u>Dabigatran 75mg（如 Pradaxa 75mg）（104/12/1）</u></p> <p><u>1.</u> 限用於靜脈血栓高危險（符合下列條件之一）病患，接受人工髖或膝關節置換術或再置換術時，預防其術後之靜脈血栓栓塞症（VTE），限用75mg，每日至多二粒，人工髖關節手術術後治療，最多5週；人工膝關節手術術後治療，最多2週：</p> <p><u>(1)</u> 曾發生有症狀之靜脈血栓症病史（須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程）之病患。</p> <p><u>(2)</u> 經靜脈超音波檢查（Venous ultrasonography）、靜脈攝影（Venography）或血中 D-dimer 檢測，診斷為靜脈血栓症之病患。</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>病。</p> <p><u>II.</u> 14 天內發生中風。</p> <p><u>III.</u> 收案前的6個月內發生嚴重中風。</p> <p><u>IV.</u> 有增加出血風險的情況。</p> <p><u>V.</u> 肌酸酐清除率小於 30mL/min。</p> <p><u>VI.</u> 活動性肝病和懷孕。</p> <p><u>3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞：</u> <u>(107/9/1)</u></p> <p><u>(1) 須經影像學或血管超音波檢查診斷。</u></p> <p><u>(2) 接受至少5日注射型抗凝血劑治療後，開始每日兩次，每次限 150mg 以下，持續治療6個月。</u></p>	<p><u>2.</u> 排除標準：</p> <p><u>(1)</u> 病人曾有嚴重心臟瓣膜疾病。</p> <p><u>(2)</u> 14天內發生中風。</p> <p><u>(3)</u> 收案前的6個月內發生嚴重中風。</p> <p><u>(4)</u> 有增加出血風險的情況。</p> <p><u>(5)</u> 肌酸酐清除率小於 30 mL/min。</p> <p><u>(6)</u> 活動性肝病和懷孕。</p>

備註：劃線部分為新修訂之規定。