

## 「藥品給付規定」修訂對照表

## 第 2 節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自 109 年 3 月 1 日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>2. 13. 1. Tolvaptan (如 Samsca) : (105/9/1、108/7/1、109/3/1)</p> <p>1. 限用於住院病人有下列情形之一者：</p> <p><u>(1) 罹患心臟衰竭引起之低血鈉症(血清鈉濃度低於 125mEq/L)</u>，經傳統治療(包括限水，loop diuretics 及補充鹽分等) 48 小時以上症狀仍無法改善之成年患者，鈉濃度達 125mEq/L(含)以上應即停藥。 (109/3/1)</p> <p><u>(2) 罹患抗利尿激素分泌不當症候群(SIADH) 引起之低血鈉症(血清鈉濃度低於 125mEq/L)</u>，經傳統治療(包括限水，loop diuretics 及補充鹽分等) 48 小時以上症狀仍無法改善之成年患者，鈉濃度達 125mEq/L(含)以上應即停藥。 (109/3/1)</p> <p>2. 每位病人每年限給付 3 次療程，同次住院限給付 1 次療程。每次療程最多給付 4 日，每日最多給付 1 粒。</p> <p>3. 須於使用後監測肝功能，肝功能指數大於正常上限 3 倍者應停用。</p>	<p>2. 13. 1. Tolvaptan (如 Samsca) : (105/9/1、108/7/1、109/3/1)</p> <p>1. 限用於住院病人罹患心臟衰竭及抗利尿激素分泌不當症候群(SIADH) 引起之低血鈉症(血清鈉濃度低於 125mEq/L)，經傳統治療(包括限水，loop diuretics 及補充鹽分等) 48 小時以上症狀仍無法改善之成年患者，鈉濃度達 125mEq/L(含)以上應即停藥。</p> <p>2. 每位病人每年限給付 3 次療程，同次住院限給付 1 次療程。每次療程最多給付 4 日，每日最多給付 1 粒。</p> <p>3. 須於使用後監測肝功能，肝功能指數大於正常上限 3 倍者應停用。</p>

備註：劃線部分為新修訂規定