

「藥品給付規定」修訂對照表

第5節 激素及影響內分泌機轉藥物

Hormones & drugs affecting hormonal mechanism

(自109年9月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>5.1.3.2. Liraglutide (如 Victoza)、dulaglutide (如 Trulicity)、 lixisenatide(如 Lyxumia) 、 <u>semaglutide (如 Ozempic)</u> (101/10/1、105/5/1、 105/8/1、107/4/1、 107/7/1、109/5/1、 109/8/1、<u>109/9/1</u>)</p> <p>1. 限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin 及/或 sulfonylurea 類藥物，且併用下列藥品之一持續6個月之後，HbA1c 仍高於8.5%以上之第二型糖尿病患者：(109/5/1) (1)SGLT-2抑制劑 (2)DPP-4抑制劑 (3)SGLT-2抑制劑合併 DPP-4抑制劑複方藥品 (4)Insulin</p> <p>2. 當患者已接受前述口服降血糖藥物，及/或基礎胰島素治療仍未達理想血糖控制時，與口服降血糖藥物及/或基礎胰島素併用。</p> <p>3. 發生重大心血管事件，如心肌梗</p>	<p>5.1.3.2. Liraglutide (如 Victoza)、dulaglutide (如 Trulicity)、 lixisenatide(如 Lyxumia) (101/10/1、105/5/1、 105/8/1、107/4/1、 107/7/1、109/5/1、109/8/1)</p> <p>1. 限用於已接受過最大耐受劑量的 metformin 及/或 sulfonylurea 類藥物，且併用下列藥品之一持續6個月之後，HbA1c 仍高於8.5%以上之第二型糖尿病患者：(109/5/1) (1)SGLT-2抑制劑 (2)DPP-4抑制劑 (3)SGLT-2抑制劑合併 DPP-4抑制劑複方藥品 (4)Insulin</p> <p>2. 當患者已接受前述口服降血糖藥物，及/或基礎胰島素治療仍未達理想血糖控制時，與口服降血糖藥物及/或基礎胰島素併用。</p> <p>3. 發生重大心血管事件，如心肌梗塞、接受冠狀動脈或其他動脈血管</p>

<p>塞、接受冠狀動脈或其他動脈血管再通術(revascularization)、動脈硬化相關之缺血性腦中風等之病人，於接受過最大耐受劑量的metformin後，仍無法理想控制血糖之第二型糖尿病患者，可考慮不須使用其他口服降血糖藥品而考慮使用 liraglutide 或 dulaglutide。</p> <p>4. 本藥品不得與 DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑併用。</p> <p>5. 109年5月1日前已依生效前之給付規定使用本類藥物之病人，得繼續使用原藥物至醫師更新其處方內容(109/8/1)。</p>	<p>再通術(revascularization)、動脈硬化相關之缺血性腦中風等之病人，於接受過最大耐受劑量的metformin後，仍無法理想控制血糖之第二型糖尿病患者，可考慮不須使用其他口服降血糖藥品而考慮使用 liraglutide 或 dulaglutide。</p> <p>4. 本藥品不得與 DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑併用。</p> <p>5. 109年5月1日前已依生效前之給付規定使用本類藥物之病人，得繼續使用原藥物至醫師更新其處方內容(109/8/1)。</p>
---	--

備註：劃線部份為新修訂規定