

「藥品給付規定」修訂對照表

第9節 抗癌藥物 Antineoplastics drugs

(自110年11月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>9. 94. Darolutamide(如 Nubeqa)： (110/11/1)</p> <p>1. 治療高風險非轉移性去勢抗性前列腺癌(high risk nmCRPC)的成年男性。</p> <p>2. 須經事前審查核准後使用。</p> <p>3. 初次申請時需檢附病理報告、使用雄性素去除療法紀錄，系列 PSA 和睪固酮數據，三個月內影像報告證明無遠端轉移。</p> <p>4. ECOG 分數須≤ 1。</p> <p>5. PSA doubling time≤ 10個月。</p> <p>6. 每3個月需再次申請，再申請時若影像學報告證實轉移則需停藥。</p> <p>7. 本品用於治療 nmCRPC 時，與 apalutamide 僅能擇一使用，且不可互換。但若屬嚴重藥品副作用耐受性不佳者，不在此限。</p>	<p>無</p>
<p>9. 90. Apalutamide (如 Erleada)： (110/3/1、110/11/1)</p> <p>1. 治療高風險非轉移性去勢抗性前列腺癌(high risk nmCRPC)的成年男性。</p> <p>(1)須經事前審查核准後使用。</p>	<p>9. 90. Apalutamide (如 Erleada)： (110/3/1)</p> <p>1. 治療高風險非轉移性去勢抗性前列腺癌(high risk nmCRPC)的成年男性。</p> <p>(1)須經事前審查核准後使用。</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>(2)初次申請時需檢附病理報告、使用雄性素去除療法紀錄，系列 PSA 和睪固酮數據，三個月內影像報告證明無遠端轉移。</p> <p>(3)ECOG 分數須≤ 1。</p> <p>(4)PSA doubling time≤ 10個月。</p> <p>(5)每3個月需再次申請，再申請時若影像學報告證實轉移則需停藥。</p> <p><u>(6)本品用於治療 nmCRPC 時，與 darolutamide 僅能擇一使用，且不可互換。但若屬嚴重藥品副作用耐受性不佳者，不在此限。</u> <u>(110/11/1)</u></p> <p>2.~3.(略)</p>	<p>(2)初次申請時需檢附病理報告、使用雄性素去除療法紀錄，系列 PSA 和睪固酮數據，三個月內影像報告證明無遠端轉移。</p> <p>(3)ECOG 分數須≤ 1。</p> <p>(4)PSA doubling time≤ 10個月。</p> <p>(5)每3個月需再次申請，再申請時若影像學報告證實轉移則需停藥。</p> <p>2.~3.(略)</p>
<p>9.49. Abiraterone(如 Zytiga)： (103/12/1、105/9/1、106/9/1、108/3/1、109/5/1、109/10/1、110/2/1、110/3/1、<u>110/11/1</u>)</p> <p>1.~5.(略)</p> <p><u>6.去勢抗性前列腺癌(CRPC)病患若先</u> <u>前使用過 apalutamide 或</u> <u>darolutamide 治療，後續不得申請</u> <u>使用 abiraterone。(110/11/1)</u></p> <p><u>7.本品與 enzalutamide 僅能擇一使</u> <u>用，且不可互換。但若屬嚴重藥品</u> <u>副作用耐受性不佳者，不在此限。</u> <u>(105/9/1、106/9/1)</u></p>	<p>9.49. Abiraterone(如 Zytiga)： (103/12/1、105/9/1、106/9/1、108/3/1、109/5/1、109/10/1、110/2/1、110/3/1)</p> <p>1.~5.(略)</p> <p><u>6.本品與 enzalutamide 僅能擇一使</u> <u>用，且不可互換。但若屬嚴重藥品</u> <u>副作用耐受性不佳者，不在此限。</u> <u>(105/9/1、106/9/1)</u></p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p><u>8.</u>本品與 radium-223 dichloride 不得合併使用。(108/3/1)</p>	<p><u>7.</u>本品與 radium-223 dichloride 不得合併使用。(108/3/1)</p>
<p>9. 54. Enzalutamide (如 Xtandi) : (105/9/1、106/9/1、108/3/1、109/10/1、110/3/1、<u>110/11/1</u>)</p> <p>1. ~4. (略)</p> <p>5. 去勢抗性前列腺癌(CRPC)病患若先前使用過 apalutamide <u>或 darolutamide</u> 治療，後續不得申請使用 enzalutamide。(110/3/1、<u>110/11/1</u>)</p> <p>6. 本品與 abiraterone 僅能擇一使用，且不可互換。但若屬嚴重藥品副作用耐受性不佳者，不在此限。(106/9/1)</p> <p>7. 本品與 radium-223 dichloride 不得合併使用。(108/3/1)</p>	<p>9. 54. Enzalutamide (如 Xtandi) : (105/9/1、106/9/1、108/3/1、109/10/1、110/3/1)</p> <p>1. ~4. (略)</p> <p>5. 去勢抗性前列腺癌(CRPC)病患若先前使用過 apalutamide 治療，後續不得申請使用 enzalutamide。(110/3/1)</p> <p>6. 本品與 abiraterone 僅能擇一使用，且不可互換。但若屬嚴重藥品副作用耐受性不佳者，不在此限。(106/9/1)</p> <p>7. 本品與 radium-223 dichloride 不得合併使用。(108/3/1)</p>

備註：劃線部分為新修訂部分