

「藥品給付規定」修訂對照表

第 7 節 腸胃藥物 Gastrointestinal drugs

(自 110 年 12 月 1 日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>7.1. 消化性潰瘍用藥：</p> <p>1. 藥品種類：(略)</p> <p>2. 使用規定：<u>(110/12/1)</u></p> <p>(1)~(4)(略)</p> <p><u>(5)因腦中風，冠狀動脈疾病或周邊血管疾病，或易出血體質(備註)而需使用雙重抗血小板藥物及抗凝血藥物，如 aspirin、warfarin、tirofiban、cilostazol、P2Y₁₂ inhibitor (如 clopidogrel、ticagrelor、ticlopidine、prasugrel) 或新一代口服抗凝血藥物 (如 rivaroxaban、apixaban、edoxaban、dabigatran) 病人得以使用每日藥費 6.5 元以下之氫離子幫浦阻斷劑(PPI)，最長以 16 週為限；若為曾接受過內視鏡檢查，經彩色內視鏡圖譜證實有活動性消化性潰瘍或上消化道出血，最長以一年為限，如使用期間或停藥後，活動性消化性潰瘍再發或上消化道出血，得再治療一年。</u></p>	<p>7.1. 消化性潰瘍用藥：</p> <p>1. 藥品種類：(略)</p> <p>2. 使用規定：</p> <p>(1)~(4)(略)</p>

<p><u>(110/12/1)</u></p> <p><u>備註：易出血性體質建議如下</u></p> <p><u>(110/12/1)：</u></p> <p><u>I. 第五期慢性腎臟病</u> <u>(eGFR<15mL/min/1.73M²)或透</u> <u>析治療中</u></p> <p><u>II. 血小板<80,000 /mm³。</u></p> <p><u>III. 肝臟疾病且 INR>1.7。</u></p> <p><u>IV. 其他凝血功能不全疾病。</u></p> <p><u>(6)需使用 NSAIDs 而曾經上消化道內</u> <u>視鏡或 X 光攝影證實有過潰瘍，得</u> <u>於使用 NSAIDs 期間內，使用消化</u> <u>性潰瘍用藥。(92/10/1、</u> <u>110/12/1)</u></p> <p><u>(7)~(14) (略)</u></p> <p><u>備註：(略)</u></p>	<p><u>(5)需使用 NSAIDs 而曾經上消化道</u> <u>內視鏡或 X 光攝影證實有過潰</u> <u>瘍，得於使用 NSAIDs 期間內，</u> <u>經消化系專科醫師之確認後可使</u> <u>用消化性潰瘍用藥。(92/10/1)</u></p> <p><u>(6)~(13)(略)</u></p> <p><u>備註：(略)</u></p>
---	---

備註：劃線部分為新修訂規定