

「藥品給付規定」修訂對照表

通則

(自111年3月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>四、注射藥品之使用原則：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)因病情需要，經醫師指導使用方法 由病人持回注射之藥品包括：</p> <p>1.~25.(略)</p> <p><u>26.Fondaparinux (如 Arixtra) 用於 靜脈血栓高危險病患，接受人工髖 或膝關節置換術或再置換術後，預 防其術後之靜脈血栓(VTE)。</u></p> <p><u>(111/3/1)</u></p>	<p>四、注射藥品之使用原則：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)因病情需要，經醫師指導使用方法 由病人持回注射之藥品包括：</p> <p>1.~25.(略)</p> <p>26.(無)</p>

備註：劃線部分為新修訂規定

「藥品給付規定」修訂對照表

第2節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自111年3月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>2.1.4.1. Fondaparinux (如 Arixtra) : (100/4/1、100/7/1、103/2/1、<u>111/3/1</u>)</p> <p>限用於</p> <p>1.~2. 略。</p> <p>3. 靜脈血栓高危險 (符合下列條件之一) 病患，接受人工髖或膝關節置換術或再置換術後，預防其術後之靜脈血栓(VTE)，限用2.5 mg 針劑皮下注射，每日一劑，最多5週： (103/2/1、<u>111/3/1</u>)</p> <p>(1) 曾發生有症狀之靜脈血栓症病史 (須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程) 之病患。</p> <p>(2) 經靜脈超音波檢查 (Venous ultrasonography) 或靜脈攝影 (Venography)，診斷為靜脈血栓症之病患。<u>(111/3/1)</u></p>	<p>2.1.4.1. Fondaparinux (如 Arixtra) : (100/4/1、100/7/1、103/2/1)</p> <p>限用於</p> <p>1.~2. 略。</p> <p>3. 靜脈血栓高危險 (符合下列條件之一) 病患，接受人工髖或膝關節置換術或再置換術後，預防其術後之靜脈血栓(VTE)，限用2.5 mg 針劑皮下注射，每日一劑，最多5週： (103/2/1)</p> <p>(1) 曾發生有症狀之靜脈血栓症病史 (須於病歷詳細說明發生之時間與診療過程) 之病患。</p> <p>(2) 經靜脈超音波檢查 (Venous ultrasonography)、靜脈攝影 (Venography) <u>或血中 D-dimer 檢測</u>，診斷為靜脈血栓症之病患。</p>

備註：劃線部分為新修訂規定。