

「藥品給付規定」修訂對照表

第1節 神經系統藥物 Drugs acting on the nervous system

(自111年3月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>1.3.3. 失智症治療藥品</p> <p>1~3. (略)</p> <p>4. 依疾病別及嚴重度，另規定如下：</p> <p>(1)阿滋海默氏症之失智症由神經科或精神科醫師處方使用。</p> <p>I. 輕度至中度失智症：(略)</p> <p>II. 中重度失智症：(95/6/1、99/10/1、102/8/1、106/10/1、<u>111/3/1</u>)</p> <p>i. (略)</p> <p>ii. 曾使用過 donepezil、rivastigmine、galantamine 其中任一種藥品之患者，<u>使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，MMSE 較起步治療時減少2分(不含)以上或 CDR 退步1級，且 MMSE 或 CDR 智能測驗達標準 (10 ≤ MMSE ≤ 14分或 CDR 2 級)，得換用或併用 memantine，惟 Exiba、Evy、Manotin 等3品項含 memantine 藥品不得與前述三種藥品併</u></p>	<p>1.3.3. 失智症治療藥品</p> <p>1~3. (略)</p> <p>4. 依疾病別及嚴重度，另規定如下：</p> <p>(1)阿滋海默氏症之失智症由神經科或精神科醫師處方使用。</p> <p>I. 輕度至中度失智症：(略)</p> <p>II. 中重度失智症：<u>限使用 memantine 口服製劑</u> (95/6/1、99/10/1、102/8/1、106/10/1)</p> <p>i. (略)。</p> <p>ii. 曾使用過 donepezil、rivastigmine、galantamine 其中任一種藥品之患者，<u>若不再適用上述其中任一藥物，且 MMSE 或 CDR 智能測驗達標準 (10 ≤ MMSE ≤ 14 分或 CDR 2級)，得換用 memantine。惟 memantine 不得與前項三種藥品併用。</u> (106/10/1)</p>

用。(106/10/1、111/3/1)

iii 換用或併用 memantine 後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，並於病歷記錄，如 MMSE 較前一次治療時減少2分(不含)以上或 CDR 退步1級，則應停用此類藥品。惟 Ebixa Tablets 及 Evy Tablets 等2種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，並於病歷記錄，如 MMSE 較起步治療時減少2分(不含)以上或 CDR 退步1級，則應停用此類藥品。(98/1/1、99/5/1、102/8/1、106/10/1、111/3/1)

III. 重度失智症：(99/10/1、102/8/1、108/5/1、111/3/1) 限使用 donepezil 及 memantine 口服製劑或是兩者併用(惟 Exiba、Evy、Manotin 等3品項含 memantine 藥品不得併用) (102/8/1、108/5/1、111/3/1)

i. ~ii. (略)

iii. 曾單獨或是併用過 memantine、donepezil、

iii. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，並於病歷記錄，如 MMSE 較前一次治療時減少2分(不含)以上或 CDR 退步1級，則應停用此類藥品。惟 Ebixa Tablets 及 Evy Tablets 等2種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，並於病歷記錄，如 MMSE 較起步治療時減少2分(不含)以上或 CDR 退步1級，則應停用此類藥品。(98/1/1、99/5/1、102/8/1、106/10/1)

III. 重度失智症：(99/10/1、102/8/1、108/5/1)限使用 donepezil 及 memantine 口服製劑 (102/8/1、108/5/1)

i. ~ ii. (略)

rivastigmine、galantamine
而不再適用者，不得使用。
(111/3/1)

iv. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較前一次治療時減少2分(不含)以上，則應停用此類藥品單獨或是併用。惟 Ebixa Tablets 及 Evy Tablets 等2種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較起步治療時減少2分(不含)以上，則應停用此類藥品。
(99/10/1、102/8/1、
108/5/1、111/3 /1)
(2)帕金森氏症之失智症:(略)

iii. 曾使用過
memantine、donepezil、
rivastigmine、galantamine 而
不再適用者，不得使用。
iv. donepezil 及 memantine 二者
不能併用。
v. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較前一次治療時減少2分(不含)以上，則應停用此類藥品。惟 Ebixa Tablets 及 Evy Tablets 等2種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較起步治療時減少2分(不含)以上，則應停用此類藥品。(99/10/1、
102/8/1、 108/5/1)

(2)帕金森氏症之失智症:(略)

備註：劃線部分為新修訂規定 WITGEN ORAL DROP