

「藥品給付規定」修訂對照表

第9節 抗癌藥物 Antineoplastics drugs

(自 111 年 12 月 1 日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>9. 18. Trastuzumab (如 Herceptin) : (91/4/1、93/8/1、95/2/1、99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1、105/11/1、108/5/1、109/2/1、<u>111/12/1</u>)</p> <p>1. 早期乳癌(99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1、<u>111/12/1</u>)</p> <p>(1)外科手術前後、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後，具 HER2 過度表現(IHC3+或 FISH+)，且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌患者，作為輔助性治療用藥，使用至多以 1 年為限。 (99/8/1、99/10/1、101/1/1、<u>111/12/1</u>)</p> <p>(2)外科手術前後、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後，符合下列所有條件之早期乳癌患者(限使用 Ogivri、Herzuma) : (<u>111/12/1</u>)</p> <p><u>I. HER2 過度表現(IHC 3+或 FISH+)。</u></p> <p><u>II. 雌激素受體 (ER)為陰性。</u></p> <p><u>III. 腫瘤大於 2 公分。須經乳房</u></p>	<p>9. 18. Trastuzumab (如 Herceptin) : (91/4/1、93/8/1、95/2/1、99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1、105/11/1、108/5/1、109/2/1)</p> <p>1. 早期乳癌(99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1)</p> <p>(1)外科手術前後、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後，具 HER2 過度表現(IHC3+或 FISH+)，且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌患者，作為輔助性治療用藥。 (99/10/1、101/1/1)</p> <p>(2)使用至多以一年為限(99/8/1)。</p>

<p><u>超音波或乳房 X 光攝影或核 磁共振診斷。</u></p> <p><u>IV. 且未發生腋下淋巴結轉移之 早期乳癌患者，作為輔助性 治療用藥。</u></p> <p><u>V. 使用至多以 6 個月為限。</u></p> <p>2. ~4. (略)。</p>	<p>2. ~4. (略)。</p>
---	--------------------

備註：劃線部分為新修訂規定