

「藥品給付規定」修訂對照表

第 9 節 抗癌瘤藥物 Antineoplastics drugs

(自 113 年 8 月 1 日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>9.49.Abiraterone(如 Zytiga)：(103/12/1、105/9/1、106/9/1、108/3/1、109/5/1、109/10/1、110/2/1、110/3/1、110/11/1、111/3/1、112/9/1、<u>113/8/1</u>)</p> <p>1.與雄性素去除療法及 prednisone 或 prednisolone 併用，治療新診斷高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)的成年男性(ECOG 分數須\leq1)。高風險需符合下列三項條件中至少兩項：<u>(109/5/1、110/2/1、113/8/1)</u></p> <p>(1)葛里森分數(Gleason score)\geq8；</p> <p>(2)骨骼掃描出現<u>三個(含)以上病灶且至少其中一處以上為非脊柱及非骨盆腔轉移；(109/5/1、113/8/1)</u></p> <p>(3)出現內臟轉移。</p> <p>2.與 prednisone 或 prednisolone 併用，治療藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌(mCRPC)，且在雄性素去除療法失敗後屬無症狀或輕度症狀(ECOG 分數0或1)，未曾接受化學治療者： (106/9/1)</p> <p>(1)~(2)(略)</p> <p>3.與 prednisone 或 prednisolone 併用，治療藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌(ECOG 分數須\leq2)且已使用過 docetaxel 2個療程以上治療無效者。</p> <p>4.前述1、2、3項須經事前審查核准後使</p>	<p>9.49.Abiraterone(如 Zytiga)：(103/12/1、105/9/1、106/9/1、108/3/1、109/5/1、109/10/1、110/2/1、110/3/1、110/11/1、111/3/1、112/9/1)</p> <p>1.與雄性素去除療法及 prednisone 或 prednisolone 併用，治療新診斷高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)的成年男性(ECOG 分數須\leq1)。高風險需符合下列三項條件中至少兩項：<u>(109/5/1、110/2/1)</u></p> <p>(1)葛里森分數(Gleason score)\geq8；</p> <p>(2)骨骼掃描出現<u>四個(含)以上病灶且至少其中一處以上為非中軸骨及骨盆腔轉移；</u></p> <p>(3)出現內臟轉移。</p> <p>2.與 prednisone 或 prednisolone 併用，治療藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌(mCRPC)，且在雄性素去除療法失敗後屬無症狀或輕度症狀(ECOG 分數0或1)，未曾接受化學治療者： (106/9/1)</p> <p>(1)~(2)(略)</p> <p>3.與 prednisone 或 prednisolone 併用，治療藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌(ECOG 分數須\leq2)且已使用過 docetaxel 2個療程以上治療無效者。</p> <p>4.前述1、2、3項須經事前審查核准後使</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>用，每3個月需再次申請。(111/3/1)</p> <p>(1)~(3)(略)</p> <p>(4)用於治療新診斷高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)的成年男性，總療程以24個月為上限；<u>Zytiga、Abiratred 500mg 總療程以36個月為上限。</u>(109/5/1、110/2/1、113/8/1)</p> <p>(5)(略)</p> <p>5.不論病人處於轉移或非轉移的狀態下，終生僅能接受一種治療前列腺癌的新型荷爾蒙藥品(abiraterone、apalutamide、darolutamide和enzalutamide)且僅能擇一給付，無效後不再給付其他新型荷爾蒙藥品，且除非出現嚴重不耐受反應導致必須永久停止治療的情況，不得互換。(112/9/1)</p> <p>6.本品與 radium-223 dichloride 不得合併使用。(108/3/1)</p>	<p>用，每3個月需再次申請。(111/3/1)</p> <p>(1)~(3)(略)</p> <p>(4)用於治療新診斷高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)的成年男性，總療程以24個月為上限。 (109/5/1、110/2/1)</p> <p>(5)(略)</p> <p>5.不論病人處於轉移或非轉移的狀態下，終生僅能接受一種治療前列腺癌的新型荷爾蒙藥品(abiraterone、apalutamide、darolutamide和enzalutamide)且僅能擇一給付，無效後不再給付其他新型荷爾蒙藥品，且除非出現嚴重不耐受反應導致必須永久停止治療的情況，不得互換。(112/9/1)</p> <p>6.本品與 radium-223 dichloride 不得合併使用。(108/3/1)</p>
<p>9.54.Enzalutamide(如 Xtandi):(105/9/1、106/9/1、108/3/1、109/10/1、110/3/1、110/11/1、111/3/1、112/9/1、<u>113/8/1</u>)</p> <p>1.治療高風險非轉移性去勢抗性前列腺癌(high risk nmCRPC)的成年男性。(112/9/1)</p> <p>(1)~(5)(略)</p> <p>2.治療高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)，且與雄性素去除療法併用，總療程以<u>36</u>個月為上限。高風險</p>	<p>9.54.Enzalutamide(如 Xtandi):(105/9/1、106/9/1、108/3/1、109/10/1、110/3/1、110/11/1、111/3/1、112/9/1)</p> <p>1.治療高風險非轉移性去勢抗性前列腺癌(high risk nmCRPC)的成年男性。(112/9/1)</p> <p>(1)~(5)(略)</p> <p>2.治療高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)，且與雄性素去除療法併用，總療程以<u>24</u>個月為上限。高風險</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>需符合下列三項條件中至少兩項（限 Xtandi）：<u>（111/3/1、113/8/1）</u></p> <p>(1)葛里森分數(Gleason score)≥8。</p> <p>(2)骨骼掃描出現三個(含)以上病灶且至少其中一處以上為非<u>脊柱</u>及非<u>骨盆</u>轉移。<u>（111/3/1、113/8/1）</u></p> <p>(3)出現內臟轉移。</p> <p>3.治療藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌(mCRPC)，且在雄性素去除療法失敗後屬無症狀或輕度症狀(ECOG 分數0或1)，未曾接受化學治療者： (106/9/1) (1)~(2)(略)</p> <p>4.治療藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌(ECOG 分數須≤2)且已使用過 docetaxel 2個療程以上治療無效者。</p> <p>5.前述2、3、4項須經事前審查核准後使用，每3個月需再次申請。<u>（111/3/1、112/9/1）</u> (1)~(3)(略)</p> <p>6.去勢抗性前列腺癌(CRPC)病患若於化學治療前先使用過 enzalutamide，當化學治療失敗後不得再申請使用 enzalutamide。<u>（106/9/1）</u></p> <p>7.不論病人處於轉移或非轉移的狀態下，終生僅能接受一種治療前列腺癌的新型荷爾蒙藥品(abiraterone、apalutamide、darolutamide 和 enzalutamide) 且僅能擇一給付，無效後不再給付其他新型荷爾蒙藥品，且</p>	<p>需符合下列三項條件中至少兩項（限 Xtandi）：<u>（111/3/1）</u></p> <p>(1)葛里森分數(Gleason score)≥8。</p> <p>(2)骨骼掃描出現三個(含)以上病灶且至少其中一處以上為非<u>中軸骨</u>及<u>骨盆</u>轉移。</p> <p>(3)出現內臟轉移。</p> <p>3.治療藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌(mCRPC)，且在雄性素去除療法失敗後屬無症狀或輕度症狀(ECOG 分數0或1)，未曾接受化學治療者： (106/9/1) (1)~(2)(略)</p> <p>4.治療藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌(ECOG 分數須≤2)且已使用過 docetaxel 2個療程以上治療無效者。</p> <p>5.前述2、3、4項須經事前審查核准後使用，每3個月需再次申請。<u>（111/3/1、112/9/1）</u> (1)~(3)(略)</p> <p>6.去勢抗性前列腺癌(CRPC)病患若於化學治療前先使用過 enzalutamide，當化學治療失敗後不得再申請使用 enzalutamide。<u>（106/9/1）</u></p> <p>7.不論病人處於轉移或非轉移的狀態下，終生僅能接受一種治療前列腺癌的新型荷爾蒙藥品(abiraterone、apalutamide、darolutamide 和 enzalutamide) 且僅能擇一給付，無效後不再給付其他新型荷爾蒙藥品，且</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>除非出現嚴重不耐受反應導致必須永久停止治療的情況，不得互換。(112/9/1)</p> <p>8.本品與 radium-223 dichloride 不得合併使用。(108/3/1)</p>	<p>除非出現嚴重不耐受反應導致必須永久停止治療的情況，不得互換。(112/9/1)</p> <p>8.本品與 radium-223 dichloride 不得合併使用。(108/3/1)</p>
<p>9.90.Apalutamide (如 Erleada) : (110/3/1、110/11/1、111/3/1、112/9/1、113/8/1)</p> <p>1.治療高風險非轉移性去勢抗性前列腺癌(high risk nmCRPC)的成年男性。 (1)~(5)(略)</p> <p>2.治療高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)，總療程以<u>36</u>個月為上限。(110/3/1、111/3/1、<u>113/8/1</u>) (1)~(3)(略) (4)前述高風險需符合下列三項條件中至少兩項：<u>(111/3/1、113/8/1)</u></p> <p>I.葛里森分數(Gleason score)≥8。 II.骨骼掃描出現<u>三個</u>(含)以上病灶且至少其中一處以上為<u>非脊柱及非骨盆腔</u>轉移。<u>(111/3/1、113/8/1)</u> III.出現內臟轉移。</p> <p>3.不論病人處於轉移或非轉移的狀態下，終生僅能接受一種治療前列腺癌的新型荷爾蒙藥品(abiraterone、apalutamide、darolutamide和enzalutamide)且僅能擇一給付，無效後不再給付其他新型荷爾蒙藥品，且除非出現嚴重不耐受反應導致必須永久停止治療的情況，不得互換。(112/9/1)</p>	<p>9.90.Apalutamide (如 Erleada) : (110/3/1、110/11/1、111/3/1、112/9/1)</p> <p>1.治療高風險非轉移性去勢抗性前列腺癌(high risk nmCRPC)的成年男性。 (1)~(5)(略)</p> <p>2.治療高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)，總療程以<u>24</u>個月為上限。(110/3/1、111/3/1) (1)~(3)(略) (4)前述高風險需符合下列三項條件中至少兩項：<u>(111/3/1)</u></p> <p>I.葛里森分數(Gleason score)≥8。 II.骨骼掃描出現<u>四個</u>(含)以上病灶且至少其中一處以上為<u>非中軸骨及骨盆腔</u>轉移。 III.出現內臟轉移。</p> <p>3.不論病人處於轉移或非轉移的狀態下，終生僅能接受一種治療前列腺癌的新型荷爾蒙藥品(abiraterone、apalutamide、darolutamide和enzalutamide)且僅能擇一給付，無效後不再給付其他新型荷爾蒙藥品，且除非出現嚴重不耐受反應導致必須永久停止治療的情況，不得互換。(112/9/1)</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>9.94.Darolutamide(如 Nubeqa) : (110/11/1、112/9/1、113/5/1、<u>113/8/1</u>)</p> <p>1.與 docetaxel 併用於治療高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)，總療程以24個月為上限。(113/5/1) (1)~(3)(略) (4)前述高風險需符合下列三項條件中至少兩項(<u>113/5/1、113/8/1</u>)： I.葛里森分數(Gleason score)≥8。 II.骨骼掃描出現<u>三個</u>(含)以上病灶且至少其中一處以上為非<u>脊柱</u>及非骨盆腔轉移。(113/5/1、113/8/1) III.出現內臟轉移。 (5)(略)</p> <p>2.治療高風險非轉移性去勢抗性前列腺癌(high risk nmCRPC)的成年男性。 (1)~(5)(略)</p> <p>3.不論病人處於轉移或非轉移的狀態下，終生僅能接受一種治療前列腺癌的新型荷爾蒙藥品(abiraterone、apalutamide、darolutamide 和 enzalutamide) 且僅能擇一給付，無效後不再給付其他新型荷爾蒙藥品，且除非出現嚴重不耐受反應導致必須永久停止治療的情況，不得互換。 (112/9/1)</p>	<p>9.94.Darolutamide(如 Nubeqa) : (110/11/1、112/9/1、113/5/1)</p> <p>1.與 docetaxel 併用於治療高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)，總療程以24個月為上限。(113/5/1) (1)~(3)(略) (4)前述高風險需符合下列三項條件中至少兩項： I.葛里森分數(Gleason score)≥8。 II.骨骼掃描出現<u>四個</u>(含)以上病灶且至少其中一處以上為非<u>中軸骨</u>及骨盆腔轉移。 III.出現內臟轉移。 (5)(略)</p> <p>2.治療高風險非轉移性去勢抗性前列腺癌(high risk nmCRPC)的成年男性。 (1)~(5)(略)</p> <p>3.不論病人處於轉移或非轉移的狀態下，終生僅能接受一種治療前列腺癌的新型荷爾蒙藥品(abiraterone、apalutamide、darolutamide 和 enzalutamide) 且僅能擇一給付，無效後不再給付其他新型荷爾蒙藥品，且除非出現嚴重不耐受反應導致必須永久停止治療的情況，不得互換。 (112/9/1)</p>

備註：劃線部分為新修訂規定