

「藥品給付規定」修訂對照表
 第9節 抗癌藥物 Antineoplastics drugs
 (自113年9月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>9.49.Abiraterone(如 Zytiga) : (103/12/1 、 105/9/1 、 106/9/1 、 108/3/1 、 109/5/1 、 109/10/1 、 110/2/1 、 110/3/1 、 110/11/1 、 111/3/1 、 112/9/1 、 113/8/1 、 <u>113/9/1</u>)</p> <p>1.與雄性素去除療法及 prednisone 或 prednisolone 併用，治療新診斷高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)的成年男性(ECOG 分數須 ≤1)。高風險需符合下列三項條件中至少兩項：(109/5/1 、 110/2/1 、 113/8/1) (1)~(3)(略)</p> <p>2.與 prednisone 或 prednisolone 併用，治療藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌(mCRPC)，且在雄性素去除療法失敗後屬無症狀或輕度症狀(ECOG 分數0或1)，未曾接受化學治療者： (106/9/1) (1)~(2)(略)</p> <p>3.(略)</p> <p>4.前述1、2、3項須經事前審查核准後使用，每3個月需再次申請。 (111/3/1) (1)~(3)(略) (4)用於治療新診斷高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)的成年</p>	<p>9.49.Abiraterone(如 Zytiga) : (103/12/1 、 105/9/1 、 106/9/1 、 108/3/1 、 109/5/1 、 109/10/1 、 110/2/1 、 110/3/1 、 110/11/1 、 111/3/1 、 112/9/1 、 113/8/1)</p> <p>1.與雄性素去除療法及 prednisone 或 prednisolone 併用，治療新診斷高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)的成年男性(ECOG 分數須 ≤1)。高風險需符合下列三項條件中至少兩項：(109/5/1 、 110/2/1 、 113/8/1) (1)~(3)(略)</p> <p>2.與 prednisone 或 prednisolone 併用，治療藥物或手術去勢抗性的轉移性前列腺癌(mCRPC)，且在雄性素去除療法失敗後屬無症狀或輕度症狀(ECOG 分數0或1)，未曾接受化學治療者： (106/9/1) (1)~(2)(略)</p> <p>3.(略)</p> <p>4.前述1、2、3項須經事前審查核准後使用，每3個月需再次申請。 (111/3/1) (1)~(3)(略) (4)用於治療新診斷高風險轉移性的去勢敏感性前列腺癌(mCSPC)的成年</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>男性，總療程以<u>36</u>個月為上限 （惟 Ateron 總療程以<u>24</u>個月為上限）。(109/5/1、110/2/1、113/8/1、<u>113/9/1</u>)</p> <p>(5)(略)</p> <p>5.~6.(略)</p>	<p>男性，總療程以<u>24</u>個月為上限； <u>Zytiga、Abiratred 500mg</u> 總療程以<u>36</u>個月為上限。(109/5/1、110/2/1、113/8/1)</p> <p>(5)(略)</p> <p>5.~6.(略)</p>

備註：劃線部分為新修訂規定