

「藥品給付規定」修訂對照表

第6節 呼吸道藥物 Respiratory tract drugs

(自113年9月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>6.2.1 Surfactant (如 <u>Survanta</u>、<u>Curosurf</u>)：(85/1/1、113/9/1)</p> <p>1. <u>用於新生兒(包含早產兒)因表面張力素不足引起的呼吸窘迫症候群 (respiratory distress syndrome, RDS)。</u> (113/9/1)</p> <p>2. <u>符合下列治療條件之一：(113/9/1)</u>  <u>(1)需使用非侵襲性陽壓呼吸治療且氧氣(FiO<sub>2</sub>)設定於30%以上者。</u>  <u>(2)使用侵襲性呼吸輔助器者。</u></p> <p>3. <u>使用時機：(113/9/1)</u>  <u>(1)Survanta：出生後48小時內最多使用4劑量，第一劑量建議在出生後8小時內使用。</u>  <u>(2)Curosurf：(113/9/1)</u>  <u>I.起始劑量最多每公斤使用200mg。</u>  <u>II.重複劑量以每12小時，可額外再給予最高兩次每公斤100mg的重複劑量(最高總量為每公斤400mg)。</u> (113/9/1)</p> <p>4. <u>Survanta 與 Curosurf 兩藥品不得併用。</u> (113/9/1)</p>	<p>6.2.1.Surfactant (如 <u>Exosurf</u>；<u>Survanta</u>)：(85/1/1)</p> <p>1. <u>新生兒 <u>hyaline membrane disease</u> 引起的呼吸窘迫症候群 (respiratory distress syndrome)。</u></p> <p>2. <u>治療條件：患有 <u>hyaline membrane disease</u> 引起呼吸窘迫症候群的新生兒，需使用人工呼吸器，且 FIO<sub>2</sub> 設定於40 % 以上，仍無法維持 blood gas PaO<sub>2</sub> 大於80 mmHg 以上或 O<sub>2</sub> artery/O<sub>2</sub> alveoli 小於0.2，並排除其他原因，如肺炎所引起的呼吸窘迫情況。</u></p> <p>3. <u>使用時機：出生後48小時內最多使用4劑量，第一劑量建議在出生後8小時內使用。</u></p>

備註：劃線部份為新修訂之規定。