

「強效CYP3A4抑制劑」類藥品之中文仿單修訂內容

一、含 clarithromycin、cobcicstat、itraconazole、posaconazole、ritonavir 及 voriconazole 成分藥品於「禁忌症」處加刊如下：

商品名(或成分名)禁止與麥角生物鹼(ergot-alkaloids)類藥品(如 ergotamine、dihydroergotamine、ergometrine(ergonovine)、methylergometrine(methylergonovine))併用，因可能增加麥角中毒風險。

二、含 clarithromycin、cobcicstat、itraconazole、posaconazole、ritonavir 及 voriconazole 成分藥品於「交互作用」處加刊如下：

麥角生物鹼(ergot-alkaloids)類藥品(如 ergotamine、dihydroergotamine、ergometrine(ergonovine)、methylergometrine(methylergonovine))：

同時投與商品名(或成分名)及麥角生物鹼類藥品，可能增加麥角生物鹼類藥品之血中濃度，引起罕見但嚴重之血管攣縮以致顱部及/或四肢缺血之風險。商品名(或成分名)禁止與麥角生物鹼(ergot-alkaloids)類藥品併用。

三、含 ceritinib 成分藥品於「交互作用」處加刊如下：

麥角生物鹼(ergot-alkaloids)類藥品(如 ergotamine、dihydroergotamine、ergometrine(ergonovine)、methylergometrine(methylergonovine))：

同時投與商品名(或成分名)及麥角生物鹼類藥品，可能增加麥角生物鹼類藥品之血中濃度，引起罕見但嚴重之血管攣縮以致顱部及/或四肢缺血之風險。