

「藥品給付規定」修訂對照表

第9節 抗癌藥物 Antineoplastics drugs

(自114年1月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>9. 70. Pertuzumab(如Perjeta)： (108/5/1、108/12/1、112/8/1、 113/12/1、114/1/1)</p> <p>1. 早期乳癌(113/12/1、114/1/1)</p> <p>(1)外科手術前後以pertuzumab與 trastuzumab (限使用Ogivri、 Herzuma、Eirgasun、Herceptin、 Kanjinti) 及化學療法(術前輔助治 療或輔助治療)併用作為輔助性治療 用藥，用於具HER2過度表現(IHC3+ 或FISH+)，且具腋下淋巴結轉移但 無遠處臟器轉移之早期乳癌病人， 若使用於外科手術後，須達病理上 緩解(pCR)。</p> <p>(2)下列 I ~ III 使用於外科手術前後之總 療程合併計算，依藥品仿單記載以 18個療程為上限：</p> <p>I：pertuzumab與trastuzumab併用 II：trastuzumab III：pertuzumab與trastuzumab皮下 注射複方製劑(如Phesgo)</p> <p>(3)須經事前審查核准後使用，核准後 每18週須檢附療效評估資料再次申 請，若疾病有惡化情形即不應再行 申請。</p>	<p>9. 70. Pertuzumab(如Perjeta)： (108/5/1、108/12/1、112/8/1、 113/12/1)</p> <p>1. 早期乳癌(113/12/1)</p> <p>(1)外科手術前後以pertuzumab與 trastuzumab (限使用Ogivri、 Herzuma、Eirgasun、Herceptin) 及化學療法(術前輔助治療或輔助治 療)併用作為輔助性治療用藥，用於 具HER2過度表現(IHC3+或FISH+)， 且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器 轉移之早期乳癌病人，若使用於外 科手術後，須達病理上緩解(pCR)。</p> <p>(2)下列 I ~ III 使用於外科手術前後之總 療程合併計算，依藥品仿單記載以 18個療程為上限：</p> <p>I：pertuzumab與trastuzumab併用 II：trastuzumab III：pertuzumab與trastuzumab皮下 注射複方製劑(如Phesgo)</p> <p>(3)須經事前審查核准後使用，核准後 每18週須檢附療效評估資料再次申 請，若疾病有惡化情形即不應再行 申請。</p>

修訂後給付規定	原給付規定
2. 轉移性乳癌(108/5/1、108/12/1、112/8/1、113/12/1)(略)	2. 轉移性乳癌(108/5/1、108/12/1、112/8/1、113/12/1)(略)
<p>9. 18. Trastuzumab (如Herceptin) : (91/4/1、93/8/1、95/2/1、99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1、105/11/1、108/5/1、109/2/1、111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1、<u>114/1/1</u>)</p> <p>1. 早期乳癌(99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1、111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1、<u>114/1/1</u>)</p> <p>(1)外科手術前後、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後，具HER2過度表現(IHC3+或FISH+)，且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌患者，作為輔助性治療用藥：(99/8/1、99/10/1、101/1/1、111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1、<u>114/1/1</u>)。</p> <p>I. 外科手術後達病理上緩解(pCR)，下列i.~iii.使用於外科手術前後之總療程合併計算，依藥品仿單記載以18個療程為上限：(113/8/1、113/12/1、<u>114/1/1</u>)</p> <p>i. 本藥品</p> <p>ii. pertuzumab與trastuzumab (限使用Ogivri、Herzuma、</p>	<p>9. 18. Trastuzumab (如Herceptin) : (91/4/1、93/8/1、95/2/1、99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1、105/11/1、108/5/1、109/2/1、111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1)</p> <p>1. 早期乳癌(99/1/1、99/8/1、99/10/1、101/1/1、111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1)</p> <p>(1)外科手術前後、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後，具HER2過度表現(IHC3+或FISH+)，且具腋下淋巴結轉移但無遠處臟器轉移之早期乳癌患者，作為輔助性治療用藥：(99/8/1、99/10/1、101/1/1、111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1)。</p> <p>I. 外科手術後達病理上緩解(pCR)，下列I~III使用於外科手術前後之總療程合併計算，依藥品仿單記載以18個療程為上限：(113/8/1、113/12/1)</p> <p>i. 本藥品</p> <p>ii. pertuzumab與trastuzumab (限使用Ogivri、Herzuma、</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>Eirgasun、Herceptin、<u>Kanjinti</u>) 併用</p> <p>iii. pertuzumab與trastuzumab皮下注射複方製劑(如Phesgo)</p> <p>II. 若外科手術後無法達病理上緩解(non-pCR)，本藥品與trastuzumab emtansine使用於外科手術前後的總療程合併計算，依藥品仿單記載以全部18個療程為上限，其中trastuzumab emtansine以14個療程為上限。(113/8/1、113/12/1)</p> <p>(2)外科手術前後、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後，符合下列所有條件之早期乳癌患者(限使用Ogivri、Herzuma、Eirgasun、Herceptin、<u>Kanjinti</u>)：</p> <p>(111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1、<u>114/1/1</u>) (略)</p> <p>2. 轉移性乳癌(略)</p> <p>3. 轉移性胃癌(略)</p> <p>4. (略)</p>	<p>Eirgasun、Herceptin) 併用</p> <p>iii. pertuzumab與trastuzumab皮下注射複方製劑(如Phesgo)</p> <p>II. 若外科手術後無法達病理上緩解(non-pCR)，本藥品與trastuzumab emtansine使用於外科手術前後的總療程合併計算，依藥品仿單記載以全部18個療程為上限，其中trastuzumab emtansine以14個療程為上限。(113/8/1、113/12/1)</p> <p>(2)外科手術前後、化學療法(術前輔助治療或輔助治療)治療後，符合下列所有條件之早期乳癌患者(限使用Ogivri、Herzuma、Eirgasun、Herceptin)：</p> <p>(111/12/1、112/10/1、113/8/1、113/12/1) (略)</p> <p>2. 轉移性乳癌(略)</p> <p>3. 轉移性胃癌(略)</p> <p>4. (略)</p>

備註: 劃線部分為新修訂規定