

「藥品給付規定」修訂對照表

第15節 婦科製劑 Gynecological preparations

(自114年2月1日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>15. 2. Atosiban(如 Betosiban、Tractocile)：(111/9/1、<u>114/2/1</u>)</p> <p>1. 限用於延遲妊娠婦女迫切的早產，並符合下列所有條件者：</p> <p>(1)18歲以上之婦女且妊娠週數在24週至33週。</p> <p>(2)規律宮縮至少持續30秒，頻率大於等於每30分鐘4次。</p> <p>(3)子宮頸擴張1至3公分（初產婦0至3公分）和子宮頸展平(cervical effacement) ≥50%。</p> <p>(4)胎兒心律正常。</p> <p>(5)<u>經使用 ritodrine 療效不彰或無法</u> 耐受其副作用、或是屬易出現嚴重副作用的高危險群孕婦，無安胎禁忌症者。「易出現嚴重副作用的高危險群孕婦」，指符合下列任1項高風險條件者：<u>(114/2/1)</u></p> <p>I. 多胞胎妊娠。</p> <p>II. 心血管疾病(如心臟衰竭、缺血性心臟病、心律不整、心搏過速)。</p> <p>III. 高血壓疾患（如慢性高血壓、妊娠高血壓、子癲前症）。</p> <p>IV. 糖尿病(包括孕前糖尿病及妊娠糖尿病)。<u>(114/2/1)</u></p>	<p>15. 2. Atosiban(如 Betosiban、Tractocile)：(111/9/1)</p> <p>1. 限用於延遲妊娠婦女迫切的早產，並符合下列所有條件者：</p> <p>(1)18歲以上之婦女且妊娠週數在24週至33週。</p> <p>(2)規律宮縮至少持續30秒，頻率大於等於每30分鐘4次。</p> <p>(3)子宮頸擴張1至3公分（初產婦0至3公分）和子宮頸展平(cervical effacement) ≥50%。</p> <p>(4)胎兒心律正常。</p> <p>(5)<u>經使用 ritodrine 療效不彰及無法</u> 耐受其副作用、或是屬易出現嚴重副作用的高危險群孕婦，無安胎禁忌症者。「易出現嚴重副作用的高危險群孕婦」，指符合下列任1項高風險條件者：</p> <p>I. 多胞胎妊娠。</p> <p>II. 心血管疾病(如心臟衰竭、缺血性心臟病、心律不整、心搏過速)。</p> <p>III. 高血壓疾患（如慢性高血壓、妊娠高血壓、子癲前症）。</p> <p>IV. 糖尿病<u>與需藥物治療的妊娠糖尿病</u>。</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>V. ~ X. (略)</p> <p><u>2. 符合延遲妊娠婦女迫切的早產第(1)至(4)項，且妊娠週數介於24-28週之極度早產者，得使用至28週。</u> (114/2/1)</p> <p>3. 療程劑量：</p> <p>(1) 一次療程時間以48小時為上限，總劑量上限為330mg。</p> <p>(2) 每次懷孕以一次療程為限。</p>	<p>V. ~ X. (略)</p> <p>2. 療程劑量：</p> <p>(1) 一次療程時間以48小時為上限，總劑量上限為330mg。</p> <p>(2) 每次懷孕以一次療程為限。</p>

備註：劃線部份為新修訂規定