

「藥品給付規定」修訂對照表

第 2 節 心臟血管及腎臟藥物 Cardiovascular-renal drugs

(自 114 年 2 月 1 日生效)

修訂給付規定	原給付規定
<p>2. 16. Dapagliflozin(如 Forxiga)、empagliflozin (如 Jardiance 10mg)：(111/5/1、111/8/1、<u>114/2/1</u>)</p> <p><u>1. 慢性收縮性心衰竭：</u></p> <p><u>(1)用於慢性收縮性心衰竭病人(LVEF <math>\leq 40\%</math>)，應完全符合下列條件：</u></p> <p><u>I. 依紐約心臟協會(NYHA)心衰竭功能分級為第二級至第四級。左心室收縮功能不全，左心室射出分率(LVEF) <math>\leq 40\%</math>(初次使用者須檢附一年內心臟超音波、心導管左心室造影、核醫、電腦斷層或磁共振造影等標準心臟功能檢查的左心室射出分率數值結果)。</u></p> <p><u>II. 經 ACEI 或 ARB 穩定劑量治療，及合併使用 <math>\beta</math>-阻斷劑最大可耐受劑量已達 4 週(含)以上或使用 <math>\beta</math>-阻斷劑有禁忌症而無法使用，仍有心衰竭症狀者。</u></p> <p><u>(2)用於慢性收縮性心衰竭病人(<math>41\% \leq \text{LVEF} \leq 49\%</math>)，應完全符合下列條件：<u>(114/2/1)</u></u></p> <p><u>I. 依紐約心臟協會(NYHA)心衰竭功能分級為第二級至第四級。左心</u></p>	<p>2. 16. Dapagliflozin(如 Forxiga)、empagliflozin (如 Jardiance 10mg)：(111/5/1、111/8/1)</p> <p><u>1. 限符合下列各項條件之慢性收縮性心衰竭患者使用：</u></p> <p><u>(1)依紐約心臟協會(NYHA)心衰竭功能分級為第二級至第四級。左心室收縮功能不全，左心室射出分率(LVEF) <math>\leq 40\%</math>(初次使用者須檢附一年內心臟超音波、心導管左心室造影、核醫、電腦斷層或磁共振造影等標準心臟功能檢查的左心室射出分率數值結果)。</u></p> <p><u>(2)經 ACEI 或 ARB 穩定劑量治療，及合併使用 <math>\beta</math>-阻斷劑最大可耐受劑量已達 4 週(含)以上或使用 <math>\beta</math>-阻斷劑有禁忌症而無法使用，仍有心衰竭症狀者。</u></p>

修訂給付規定	原給付規定
<p><u>室收縮功能不全，左心室射出分率(LVEF) <math>\geq 41</math> 且 <math>\leq 49\%</math>(初次使用者須檢附一年內心臟超音波、心導管左心室造影、核醫、電腦斷層或磁振造影等標準心臟功能檢查的左心室射出分率數值結果)。</u></p> <p><u>II. 經 ACEI 或 ARB 穩定劑量治療，及合併使用 <math>\beta</math>-阻斷劑最大可耐受劑量已達 4 週(含)以上或使用 <math>\beta</math>-阻斷劑有禁忌症而無法使用，仍有心衰竭症狀者。</u></p> <p><u>III. 過去曾有心臟衰竭住院病史或經心臟專科醫師診斷為心衰竭者。</u></p> <p><u>2. 慢性腎臟病：(114/2/1)</u></p> <p><u>(1) 限用於參加「初期慢性腎臟病照護整合方案」或「全民健康保險末期腎臟病前期(Pre-ESRD)之病人照護與衛教計畫」之慢性腎臟病病人，應完全符合下列條件：</u></p> <p><u>I. 接受 dapagliflozin 或 empagliflozin 治療前應穩定接受最大耐受劑量的 ACEI 或 ARB 至少 4 週。</u></p> <p><u>II. 起始治療 eGFR <math>\geq 25</math> 且 <math>\leq 60\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2</math>。</u></p> <p><u>III. uACR <math>\geq 200</math> 且 <math>\leq 5000/\text{mg}/\text{g}</math>。</u></p> <p><u>IV. 須排除有以下任一情形：</u></p> <p><u>i. 第 1 型糖尿病。</u></p>	

修訂給付規定	原給付規定
<p><u>ii. 已知為多囊腎、紅斑性狼瘡相關腎病，或抗中性粒細胞胞漿抗體(ANCA)相關血管炎。</u></p> <p><u>iii. 六個月內接受化療/免疫抑制治療或其他原發性或繼發性腎臟疾病的免疫治療。</u></p> <p><u>iv. 器官移植病史。</u></p> <p><u>v. 急性心肌梗塞、不穩定型心絞痛、中風或 12 週內短暫性腦缺血發作。</u></p> <p><u>vi. 12 週內冠狀動脈血運重建術。</u></p> <p><u>(2)使用後 eGFR 下降至 &lt;15mL/min/1.73m<sup>2</sup>，應予停藥。</u></p> <p><u>3. 每日最多處方 1 粒。</u></p>	<p><u>2. 每日最多處方 1 粒。</u></p>

備註：劃線部分為新修訂規定