

含teicoplanin成分藥品之中文仿單修訂內容

- 「警語及注意事項」段落(應包含下列內容)：

嚴重的皮膚性不良反應(SCARs)

曾有報告指出使用teicoplanin引起具生命威脅性與致命的嚴重皮膚不良反應，包括Stevens-Johnson症候群(SJS)，毒性表皮壞死症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)和藥物疹合併嗜伊紅血症及全身症狀(DRESS)。也曾有急性廣泛性發疹性膿皰症(AGEP)的報告。處方此藥物時，病人應被告知嚴重皮膚不良反應的徵兆或症狀(例如愈來愈嚴重的皮疹常併有水泡或黏膜病灶或膿皰疹或任何其他皮膚過敏的症狀)並嚴密監控。如果出現有嚴重皮膚不良反應的徵兆或症狀，應立即停止teicoplanin的使用並考慮其他藥物的治療。

- 「不良反應」段落(應包含下列內容)：

毒性表皮壞死、多形紅斑、Stevens-Johnson 症候群、急性廣泛性發疹性膿皰症。

- 刪除「副作用」段落(應刪除下列內容)：

Teicoplanin 的耐受性極佳，所發生的不良反應都是輕微而暫時性的，很少必須要停藥處置。