

「藥品給付規定」修訂對照表

第 5 節 激素及影響內分泌機轉藥物

Hormones & drugs affecting hormonal mechanism

(自 115 年 7 月 1 日生效)

修訂後給付規定	原給付規定
<p>5.6.1. 抗骨質再吸收劑 (anti-resorptive) (101/3/1、101/5/1、102/2/1、102/8/1、103/2/1、103/10/1、104/8/1、106/12/1、114/3/1、<u>115/7/1</u>)</p> <p>1. 藥品種類(略)</p> <p>2. 使用規定</p> <p>(1)使用條件</p> <p>I. 限用於停經後婦女 (alendronate、zoledronate、denosumab 及 risedronate 35mg 亦可使用於男性，risedronate 150mg 不可使用於男性) 因骨質疏鬆症 (須經 DXA 檢測 BMD 之 T score $\leq -2.5SD$) 引起脊椎或髖部骨折，或因骨質減少症 (osteopenia)(經 DXA 檢測 BMD 之 $-2.5SD < T \text{ score} < -1.0SD$)引起脊椎或髖部 2 處或 2 次(含)以上之骨折。使用 <u>Prolia</u>、<u>Alendronate Sandoz 70mg Tablets</u> 及 <u>PlusDmax Tablets</u> "<u>Sinphar</u>"除上述條件外，亦可用於前述因骨質疏鬆症引起之遠端</p>	<p>5.6.1. 抗骨質再吸收劑 (anti-resorptive) (101/3/1、101/5/1、102/2/1、102/8/1、103/2/1、103/10/1、104/8/1、106/12/1、114/3/1)</p> <p>1. 藥品種類(略)</p> <p>2. 使用規定</p> <p>(1)使用條件</p> <p>I. 限用於停經後婦女 (alendronate、zoledronate、denosumab 及 risedronate 35mg 亦可使用於男性，risedronate 150mg 不可使用於男性) 因骨質疏鬆症 (須經 DXA 檢測 BMD 之 T score $\leq -2.5SD$) 引起脊椎或髖部骨折，或因骨質減少症 (osteopenia)(經 DXA 檢測 BMD 之 $-2.5SD < T \text{ score} < -1.0SD$)引起脊椎或髖部 2 處或 2 次(含)以上之骨折。使用 <u>Prolia</u> 及 <u>Alendronate Sandoz 70mg Tablets</u> 除上述條件外，亦可用於前述因骨質疏鬆症引起之遠端橈骨或近端肱骨骨折，或骨質減少</p>

修訂後給付規定	原給付規定
<p>橈骨或近端肱骨骨折，或骨質疏松症引起之遠端橈骨、近端肱骨 2 處或 2 次(含)以上之骨折。 (101/5/1、102/8/1、103/10/1、104/8/1、106/12/1、114/3/1、<u>115/7/1</u>)</p> <p>II. 用於骨質疏松症患者 (須經 DXA 檢測 BMD 之 T-score\leq-2.5)，且合併下列至少一項骨質疏松性骨折高風險因子者，限使用 Prolia、Alendronate Sandoz 70mg Tablets 及 <u>PlusDmax Tablets "Sinphar"</u>，且須於病歷上載明： (114/3/1、<u>115/7/1</u>)</p> <p>i 類風溼性關節炎。 ii 糖尿病且使用胰島素。 iii 使用糖皮質類固醇(>5 毫克/天)超過 3 個月。</p> <p>(2)治療時，一次限用一項藥物，不得併用其他骨質疏松症治療藥物。 (3)使用雙磷酸鹽類藥物，須先檢測病患之血清 creatinine 濃度，符合該項藥物仿單之建議規定。</p>	<p>症引起之遠端橈骨、近端肱骨 2 處或 2 次(含)以上之骨折。 (101/5/1、102/8/1、103/10/1、104/8/1、106/12/1、114/3/1)</p> <p>II. 用於骨質疏松症患者 (須經 DXA 檢測 BMD 之 T-score\leq-2.5)，且合併下列至少一項骨質疏松性骨折高風險因子者，限使用 Prolia 及 Alendronate Sandoz 70mg Tablets，且須於病歷上載明： (114/3/1)</p> <p>i 類風溼性關節炎。 ii 糖尿病且使用胰島素。 iii 使用糖皮質類固醇(>5 毫克/天)超過 3 個月。</p> <p>(2)治療時，一次限用一項藥物，不得併用其他骨質疏松症治療藥物。 (3)使用雙磷酸鹽類藥物，須先檢測病患之血清 creatinine 濃度，符合該項藥物仿單之建議規定。</p>

備註:劃線部分為新修訂規定