

【警語及注意事項：警語/注意事項】段落（應包含下列內容）：

● 濫用、誤用及成癮

- 使用 benzodiazepine 類藥品（包含[商品名]）會使病人暴露於濫用、誤用及成癮的風險中，並可能導致過量服用或死亡。Benzodiazepine 類藥品之濫用與誤用，常見於與其他藥物、酒精及／或非法物質之併用，且與嚴重不良事件發生率增加相關，包括呼吸抑制、藥物過量及死亡。在開立 benzodiazepine 類藥品前及整個治療過程中應評估並監測病人發生濫用、誤用及成癮的風險。
- 開立處方時應使用最低有效劑量，並盡量避免同時使用中樞神經抑制劑及其他與濫用、誤用、成癮相關的物質（如：鴉片類止痛劑、興奮劑）。
- 應教導病人正確的藥品儲存方法，以及如何處理未使用的藥品。
- 若懷疑病人有物質使用障礙(substance use disorder)，應評估病人並視情況開始（或轉診）物質濫用的早期治療。

● 依賴性/耐受性及戒斷症狀

- 持續使用 benzodiazepine 類藥品（包含[商品名]）可能導致臨床上顯著的藥物依賴（包含生理及心理性之依賴）。治療時間越長、劑量越高，發生依賴和戒斷的風險就越大，但短期使用建議的治療劑量也可能產生依賴。
- 具有精神障礙及／或物質使用障礙（包含酒精）病史的病人發生依賴的風險較高。
- 應向病人說明產生耐受性的風險及症狀，如：長期使用後發現療效降低，需要增加劑量以達到與最初控制症狀時相同的效果。
- 長期使用[商品名]後突然停藥或快速降低劑量可能引起戒斷症狀，甚至危及生命（如：癲癇發作）。為了降低發生戒斷症狀的風險，應在密切監測下採用逐漸降低劑量的方式停藥或降低劑量。